

PRIMA DELL'USO LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista.
- Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

CONNETTIVINA

0,2% Crema

0,2% Gel

2 mg Garze impregnate

4 mg Garze impregnate

12 mg Garze impregnate

200 mg/100 ml Spray cutaneo, soluzione

Acido ialuronico sale sodico

Composizione

CONNETTIVINA 0,2% Crema. *Principio attivo:* acido ialuronico sale sodico 2 mg/g (30 mg per tubo da 15 g)
Eccipienti: polietilenglicole 400 monostearato, estere decilico dell'acido oleico, cera emulsionante, glicerolo, sorbitolo soluzione al 70%, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, sodio deidroacetato, aroma (Dalin PH), acqua depurata.

CONNETTIVINA 0,2% Gel. *Principio attivo:* acido ialuronico sale sodico 2 mg/g (60 mg per tubo da 30 g)
Eccipienti: sorbitolo 70% non cristallizzabile, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, sodio deidroacetato, carbomer 940, sodio idrossido, acqua depurata

CONNETTIVINA 2 mg Garze impregnate. Ogni garza (cm 10x10) è impregnata con 4 g di crema contenente:
Principio attivo: acido ialuronico sale sodico 2 mg. *Eccipienti:* glicerolo, polietilenglicole 4000, acqua depurata

CONNETTIVINA 4 mg Garze impregnate. Ogni garza (cm 10x20) è impregnata con 8 g di crema contenente:
Principio attivo: acido ialuronico sale sodico 4 mg. *Eccipienti:* glicerolo, polietilenglicole 4000, acqua depurata

CONNETTIVINA 12 mg Garze impregnate. Ogni garza (cm 20x30) è impregnata con 24 g di crema contenente:
Principio attivo: acido ialuronico sale sodico 12 mg. *Eccipienti:* glicerolo, polietilenglicole 4000, acqua depurata

CONNETTIVINA 200 mg/100 ml Spray cutaneo, soluzione. *Principio attivo:* acido ialuronico sale sodico 2 mg/ml (40 mg per flacone da 20 ml). *Eccipienti:* sodio cloruro, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

Come si presenta

CONNETTIVINA si presenta in diverse forme per uso esterno:

Crema: tubo da 15 g.

Gel: tubo da 30 g.

2 mg Garze impregnate: 10 garze impregnate sterili cm 10x10 per uso cutaneo.

4 mg Garze impregnate: 10 garze impregnate sterili cm 10x20 per uso cutaneo.

12 mg Garze impregnate: 5 garze impregnate sterili cm 20x30 per uso cutaneo.

Spray cutaneo, soluzione: flacone nebulizzatore contenente 20 ml di soluzione.

Che cos'è

CONNETTIVINA è un cicatrizzante impiegato per il trattamento di ferite ed ulcerazioni cutanee.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

Fidia Farmaceutici S.p.A. - Via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (PD) - Italia

Produttore e controllore finale

Fidia Farmaceutici S.p.A. - Via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (PD) - Italia

Perché si usa

CONNETTIVINA stimola la riparazione e la rigenerazione della pelle, accelerando la guarigione di abrasioni, escoriazioni, ferite superficiali, scottature, ustioni di lieve entità e ragadi al seno.

CONNETTIVINA è anche indicato nelle irritazioni cutanee localizzate, determinate da agenti fisici quali sole, freddo, vento, negli arrossamenti da pannolino, nelle irritazioni e nella disidratazione conseguenti a trattamenti di radioterapia.

CONNETTIVINA può essere inoltre impiegato come coadiuvante nel trattamento delle ulcere cutanee di origine vascolare e delle ferite a lenta guarigione come le piaghe da decubito.

Quando non deve essere usato

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate da un punto di vista chimico.

Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico

Per l'impiego di CONNETTIVINA non è necessario consultare il medico.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

CONNETTIVINA può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Precauzioni per l'uso

Prima dell'applicazione di CONNETTIVINA detergere e disinfettare la zona da trattare.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale

Non sono mai stati segnalati fenomeni di interazione tra CONNETTIVINA e antibiotici o altri trattamenti locali.

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

È importante sapere che

L'uso del prodotto, specie se prolungato, può dar origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso è necessario interrompere il trattamento e rivolgersi al proprio medico. Il prodotto non interferisce sulla capacità di guidare e sull'uso di macchinari.

Come usare questo medicinale

Quanto

Spray cutaneo, soluzione; Crema; Gel: trattare la lesione 2-3 volte al giorno, applicando la quantità di prodotto necessaria per coprire uniformemente tutta la zona interessata.

Garze impregnate: applicare una o più garze a seconda dell'estensione della zona da trattare, cambiandola/le 2-3 volte al giorno.

ATTENZIONE: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Quando e per quanto tempo

ATTENZIONE: usare solo per brevi periodi di trattamento. Se il disturbo persiste consultate il medico.

Come

Prima di applicare CONNETTIVINA detergere e disinfettare accuratamente la lesione.

Crema e Gel: distribuire uniformemente la quantità necessaria a coprire la lesione aiutandosi con una garza sterile nel caso di ferita aperta.

Garza impregnata: prelevarla dalla busta limitandosi a toccarne soltanto un'estremità, applicarla sulla lesione e coprire con opportuno bendaggio.

Spray cutaneo, soluzione: erogare la soluzione uniformemente sulla lesione.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale

Non sono mai state segnalate manifestazioni di intossicazione da sovradosaggio di CONNETTIVINA.

Il prodotto è ad esclusivo uso esterno. In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di CONNETTIVINA avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

Effetti indesiderati

Non sono mai stati segnalati effetti indesiderati di tipo sistemico associati a CONNETTIVINA. Sporadicamente sono state registrate reazioni di tipo locale, sempre di modesta entità, che si sono risolte spontaneamente.

L'uso del prodotto, specie se prolungato, può dar origine a fenomeni di sensibilizzazione.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Quando si presentano, è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati, disponibile in farmacia (modello B).

Scadenza e conservazione

La data di scadenza indicata sulla confezione si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

ATTENZIONE: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco: febbraio 2006